

VANCOMICINA 5% COLÍRIO

Forma Farmacêutica

Colírio – solução estéril, límpida e incolor.

Fórmula

Componente	Quantidade
Vancomicina	5%
Veículo qsp	5mL

*Fórmula manipulada

Embalagem e Armazenamento

Pó em frasco de vidro âmbar estéril, perfeitamente fechado e diluente em frasco conta-gotas estéril leitoso com lacre, perfeitamente fechado contendo 5mL. Conservar em temperatura ambiente, ao abrigo da luz. Depois de reconstituído, conservar em geladeira e descartar 14 dias após reconstituição.

Advertência

Suspender o uso se houver mudança de cor ou odor. Evitar o contato do conta-gotas com os dedos e com as superfícies das pálpebras ou dos olhos. Não lavar o conta-gotas. Manter fora do alcance de crianças. Não utilizar durante a gravidez ou lactação sem orientação médica. Contraindicado para pessoas que apresentam alergia a qualquer um dos componentes da sua fórmula. O uso prolongado de antibióticos pode ocasionalmente favorecer a infecção por micro-organismos não sensíveis, inclusive fungos. Pode ser desenvolvida resistência bacteriana com o uso de VANCOMICINA

Reações adversas

Irritação dos olhos transitória (irritação passageira), vermelhidão dos olhos, vermelhidão conjuntival, dor nos olhos, infecções secundárias por micro-organismos não sensíveis e reações alérgicas.

Indicações

Indicado no tratamento de infecções externas do globo ocular e seus anexos, causadas por micro-organismos sensíveis à vancomicina. É indicado também para o tratamento de conjuntivite, ceratite (inflamação da córnea), ceratoconjuntivite (inflamação dos olhos), úlcera de córnea, blefarite (inflamação da pálpebra), blefarconjuntivite (inflamação conjunta da pálpebra e conjuntiva) e dacriocistite (inflamação do saco lacrimal).

Modo de usar

Uso oftálmico. Colírio - conforme recomendação médica.

Formulações Oculares Manipuladas

Colírios e Pomadas Oftálmicas Estéreis

Informações Gerais:

Colírios e/ou pomadas oftálmicas manipuladas são prescritas quando a concentração de princípio ativo ou a associação de princípios ativos ideais para o tratamento não é encontrada no mercado. São produtos estéreis, com a ausência de microrganismos, porém, esta esterilidade é garantida até o momento da abertura dos frascos e tubos. A partir deste momento, cabe ao paciente evitar que os produtos sejam contaminados.

Estes são chamados de medicamentos extemporâneos, ou seja, devem ser feitos para um paciente utilizar durante um tempo específico e que é normalmente pequeno. O medicamento manipulado é personalizado, de uso exclusivo do paciente ao qual foi indicado.

- Mantenha o medicamento sempre na embalagem original. Frascos reutilizados podem conter bactérias que acabam por contaminar o produto;
- O peso e volume dos produtos correspondem ao discriminado no rótulo e independe da capacidade máxima da embalagem;
- Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance de crianças;
- Siga corretamente a orientação médica;
- Não desaparecendo os sintomas ou ocorrendo reação adversa, informe o seu médico;
- Leia atentamente o rótulo;

Precauções e Advertências:

- Antes de aplicar os produtos, verificar os prazos de validade dos mesmos. Nunca utilizar medicamentos com prazo de validade vencidos;

- Não utilizar medicamento indicado a outra pessoa e não emprestar a ninguém o seu medicamento;
- Não encostar o dedo, os cílios ou qualquer outro objeto no bico gotejador do colírio nem na abertura da bisnaga da pomada, para não contaminar o produto;
- Se o produto for de uso único, destruí-lo após o uso, não armazenar nenhum resto de produto;
- Verificar se o colírio apresenta partículas estranhas, depósito no fundo do frasco e alteração da coloração. Em caso positivo, contate-nos;
- No caso de o paciente ter que utilizar colírio e pomada oftalmológica num mesmo tratamento, pingar primeiro o colírio e, após 10 minutos, aplicar a pomada. Não inverter a ordem, uma vez que a pomada adere à superfície ocular promovendo uma barreira que pode impedir o contato do colírio com a área a ser tratada.

Reações Adversas:

Podem ocorrer reações alérgicas com o uso de qualquer medicamento, manipulado ou não. Em caso de aparecimento de inchaço, vermelhidão, coceira e/ou ardor muito forte, consulte seu médico.

Instruções de Uso:

Para a reconstituição:

1. Lavar e secar cuidadosamente as mãos e procurar um ambiente adequado.
2. Abrir o frasco do diluente (frasco conta-gotas leitoso).
3. Abrir o frasco contendo o pó (frasco de vidro âmbar)
4. Transferir o diluente para dentro do frasco de vidro âmbar.
5. Fechar bem o frasco âmbar e homogeneizar bem. Esperar alguns minutos para desfazer as bolhas.
6. Deitar ou inclinar a cabeça para trás;
7. Puxar a pálpebra inferior para baixo, com o dedo indicador;
8. Pingar o colírio no espaço que se formou, cuidando para não encostar o aplicador nos olhos, evitando, assim, a contaminação do produto.
9. Fechar os olhos devagar, para não extravasar o produto. Evite levar as mãos aos olhos. Se necessário, seque o excesso com uma toalhinha de papel.
10. Manter o medicamento na geladeira entre as aplicações.

Se seu oftalmologista prescrever dois ou mais colírios diferentes, dê um intervalo de 10 minutos entre eles para que cada um possa fazer o seu efeito. Se tiver uma pomada no tratamento, aplique-a por último.



Colírio

Prazo de Validade: Atenção ao prazo de validade do medicamento impresso no rótulo. Após reconstituição do medicamento, armazenar na geladeira. Descartar 14 dias após reconstituído.

Observação: O eventual atraso na entrega do medicamento pode tornar-se necessário caso haja necessidade de a farmácia entrar em contato com o médico que prescreveu a fórmula para resolver algum problema técnico. Assim pedimos a sua compreensão;



Rua Waldomiro Schapke, 930 – Partenon
Porto Alegre – RS. CEP 91530-390
CNPJ 29.129.366/0001-47 Tel. 51 3110 4282
Resp. Tec.: Fernanda Pan CRF-RS 11128
Lisia Albarello CRF-RS 11059