

Forma Farmacêutica

Colírio – solução estéril, límpida e incolor.

Fórmula

Componente	Quantidade
Clorexidina	0,02%
Veículo qsp	5mL

*Fórmula manipulada

Embalagem e Armazenamento

Em frasco conta-gotas estéril, leitoso com lacre, perfeitamente fechado. Conservar em geladeira, ao abrigo da luz.

Advertência

Suspender o uso se houver mudança de cor ou odor. Evitar o contato do conta-gotas com os dedos e com as superfícies das pálpebras ou dos olhos. Não lavar o conta-gotas. Manter fora do alcance de crianças.

Indicações

Clorexidina é um bactericida de amplo espectro e rápida ação. Indicado para tratamento de ceratite por Acanthamoeba, anti-séptico ocular e antiprotozoário.

Modo de usar

Uso externo. O tratamento, normalmente, inicia-se intensivo e reduzido aos poucos. Seguir orientação médica.

Colírios e Pomadas Oftálmicas Estéreis

Informações Gerais:

Colírios e/ou pomadas oftálmicas manipuladas são prescritas quando a concentração de princípio ativo ou a associação de princípios ativos ideais para o tratamento não é encontrada no mercado. São produtos estéreis, com a ausência de microrganismos, porém, esta esterilidade é garantida até o momento da abertura dos frascos e tubos. A partir deste momento, cabe ao paciente evitar que os produtos sejam contaminados.

Estes são chamados de medicamentos extemporâneos, ou seja, devem ser feitos para um paciente utilizar durante um tempo específico e que é normalmente pequeno. O medicamento manipulado é personalizado, de uso exclusivo do paciente ao qual foi indicado.

- Mantenha o medicamento sempre na embalagem original. Frascos reutilizados podem conter bactérias que acabam por contaminar o produto;
- O peso e volume dos produtos correspondem ao discriminado no rótulo e independem da capacidade máxima da embalagem;
- Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance de crianças;
- Siga corretamente a orientação médica;
- Não desaparecimento os sintomas ou ocorrendo reação adversa, informe o seu médico;
- Leia atentamente o rótulo;

Precauções e Advertências:

- Antes de aplicar os produtos, verificar os prazos de validade dos mesmos. Nunca utilizar medicamentos com prazo de validade vencidos;
- Não utilizar medicamento indicado a outra pessoa e não emprestar a ninguém o seu medicamento;
- Não encostar o dedo, os cílios ou qualquer outro objeto no bico gotejador do colírio nem na abertura da bisnaga da pomada, para não contaminar o produto;

- Se o produto for de uso único, destruí-lo após o uso, não armazenar nenhum resto de produto;
- Verificar se o colírio apresenta partículas estranhas, depósito no fundo do frasco e alteração da coloração. Em caso positivo, contate-nos;
- No caso de o paciente ter que utilizar colírio e pomada oftalmológica num mesmo tratamento, pingar primeiro o colírio e, após 10 minutos, aplicar a pomada. Não inverter a ordem, uma vez que a pomada adere à superfície ocular promovendo uma barreira que pode impedir o contato do colírio com a área a ser tratada.

Reações Adversas:

Podem ocorrer reações alérgicas com o uso de qualquer medicamento, manipulado ou não. Em caso de aparecimento de inchaço, vermelhidão, coceira e/ou ardor muito forte, consulte seu médico.


Instruções de Uso:

1. Lavar e secar cuidadosamente as mãos;
2. Deitar ou inclinar a cabeça para trás;
3. Puxar a pálpebra inferior para baixo, com o dedo indicador;
4. Pingar o colírio no espaço que se formou, cuidando para não encostar o aplicador nos olhos, evitando, assim, a contaminação do produto.
5. Fechar os olhos devagar, para não extravasar o produto. Evite levar as mãos aos olhos. Se necessário, seque o excesso com uma toalhinha de papel.

Se seu oftalmologista prescrever dois ou mais colírios diferentes, dê um intervalo de 10 minutos entre eles para que cada um possa fazer o seu efeito. Se tiver uma pomada no tratamento, aplique-a por último.



Colírio



Pomada oftálmica

Prazo de Validade: Atenção ao prazo de validade do medicamento impresso no rótulo.

Armazenagem: Manter o medicamento em sua embalagem original, fechada, ao abrigo da luz, calor e umidade. Ficar atento quanto à armazenagem específica referenciada no rótulo.

Observação: O eventual atraso na entrega do medicamento pode tornar-se necessário caso haja necessidade de a farmácia entrar em contato com o médico que prescreveu a fórmula para resolver algum problema técnico. Assim pedimos a sua compreensão;

OFTÁLMICA
MANIPULAÇÃO

Rua Waldomiro Schapke, 930 – Partenon
Porto Alegre – RS. CEP 91530-390
CNPJ 29.129.366/0001-47 Tel. 51 3110 4282
Resp. Tec.: Fernanda Pan CRF-RS 11128
Lisia Albarello CRF-RS 11059